



**Preparat Undofen ® atomizer może być stosowany:**

***Lecznico***

W powierzchniowych zakażeniach grzybiczych skóry stóp, jak również dłoni, pachwin, pach, głowy oraz w towarzyszących im nadkażeniach bakteryjnych.

***Profilaktycznie***

W celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym stóp (po kontakcie stóp z miejscami potencjalnego zakażenia występującymi np. na basenie, w łaźni).

Po przebytej grzybicy stóp, w celu zapobieżenia nawrotom choroby. Stosowanie preparatu zmniejsza powstawanie nieprzyjemnego zapachu towarzyszącego nadmiernej potliwości stóp.

**1. Zanim zastosuje się Undofen ® atomizer**

***Nie należy stosować preparatu Undofen ® atomizer :***

- na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym
- u osób nadwrażliwych na substancje czynne lub inne składniki preparatu

***Zachowaj szczególną ostrożność stosując Undofen ® atomizer :***

Stosowanie preparatu na otartą bądź uszkodzoną skórę może wywołać przemijające pieczenie.

Preparat może być bezpiecznie stosowany zarówno u dorosłych jak i dzieci powyżej 2 roku życia. Stosowanie u dzieci poniżej 2 roku życia powinno odbywać się na zlecenie lekarza specjalisty

Preparatu nie należy stosować na błony śluzowe.

***Stosowanie preparatu Undofen ® atomizer wraz z innymi lekami :***

Nie odnotowano informacji o oddziaływaniu preparatu Undofen ® atomizer z innymi lekami do stosowania na skórę.

***Stosowanie preparatu Undofen ® atomizer podczas ciąży:***

Stosowanie u kobiet w ciąży na zlecenie lekarza specjalisty.

***Stosowanie preparatu Undofen ® atomizer w okresie karmienia piersią :***

Stosowanie u kobiet w okresie karmienia piersią na zlecenie lekarza specjalisty.

***Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn :***

Undofen ® atomizer nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

## 2. Jak stosować Undofen ® atomizer ?

*Przed zastosowaniem należy :*

- *Sprawdzić termin ważności umieszczony na opakowaniu*
- *Wstrząsnąć preparat*

*Undofen ® atomizer należy stosować:*

- *na umytą i starannie osuszoną skórę,*
- *w pozycji pionowej.*

*Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami.*

### *Lecznictwo*

Spryskać dokładnie zakażone powierzchnie skóry. Zabieg należy wykonywać 2 do 3 razy dziennie przez okres od 2 do 4 tygodni. Po ustąpieniu objawów preparat należy stosować przez okres kolejnych 4 tygodni. Zaleca się również spryskiwanie wnętrza obuwia oraz skarpet.

Dalsze, codzienne stosowanie preparatu pomaga zapobiec powtórnemu zakażeniu.

### *Profilaktycznie*

Preparat należy stosować raz dziennie spryskując nim dokładnie stopy oraz przestrzenie między palcami.

*W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się po poradę do lekarza.*

## 3. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, **Undofen ® atomizer** może powodować działania niepożądane.

W przypadku zaobserwowania takich objawów jak miejscowe podrażnienie skóry, pieczenie, wysypka należy odstawić preparat **Undofen ® atomizer** i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu **Undofen ® atomizer** mogą wystąpić inne działania niepożądane nie wymienione w niniejszej ulotce. O ich pojawieniu się należy poinformować lekarza.

## 4. Przechowywanie preparatu Undofen ® atomizer

- Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

- Lek przechowywać w temperaturze do 25°C, nie zamrażać.

**Stosować do :**

Nie należy stosować preparatu **Undofen ® atomizer** po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

***W razie pytań i wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.***


**Data nowelizacji ulotki : listopad 2002**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych  
Wyrobow Medycznych i Produktów Biolóycznych  
ZATWIERDZA

dn. 23.10.2002 r.

Issue number: 2.0

Issue date: 14.11..2002

PREZES  
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobow Medycznych i Produktów Biolóycznych  
  
prof. dr hab. med. Michał Pirożyński